

에어펜® 정 100 mg

(아세클로페낙)

AIRPEN®

전문약품

분류번호 114



[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분: 아세클로페낙(KP) 100mg
- 첨가제: 미결정셀룰로스, 산화티탄, 스테아르산나트륨, 전분, 건분글리콜산나트륨, 셀룰로스, 폴리에틸렌글리콜 4000, 히프록셀로스 2910

[성상] 백색의 원형 필름코팅정제

[효능·효과]

류마티스관절염, 강직척추염, 골관절염(퇴행관절염) 및 견갑상완골의 관절 주위염, 치통, 외상 후 생기는 염증, 요통, 좌골통, 비관절성 류마티즘으로 인한 통증

[용법·용량]

- 성인: 아세클로페낙으로서 1회 100mg을 12시간마다 1일 2회 복용한다.
- 간장애 환자: 초기 용량으로 1일 100mg을 투여한다.

이 약은 씹거나 부수지 말고 그대로 복용한다.

증상에 따라 적절히 증감한다.

이 약의 심혈관계 이상반응을 최소화하기 위해 최저 유효 용량으로 최대한 기간 동안 투여해야 한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

- 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용할 때 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.
- 2) 심혈관계 위험 및 뇌혈관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 중대한 심혈관계 혈전 반응, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 율혈성 심부전(New York Heart Association(NYHA) I) 및 심혈관계 질환과 관련하여 중요한 위험인자(예, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 흡연)를 지닌 환자는 신중하게 검토한 후에 이 약의 치료를 시작해야 한다. 이 약의 투여로 인한 심혈관계 질환의 위험성은 투여량과 투여기간에 따라 증가될 수 있으므로, 가능한 최단기간동안 일일 최저 유효 용량으로 투여해야 한다. 환자의 증상 완화에만 대한 요구와 치료에 대한 반응은 주기적으로 재평가해야 한다. 의사와 환자는 이러한 심혈관계 증상의 발현에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 이는 심혈관계 질환의 병력이 없는 경우에도 마찬가지로 적용된다. 환자는 중대한 심혈관계 특성의 징후 및/또는 증상 및 이러한 증상이 발현되는 경우 취할 처치에 대하여 사전에 알고 있어야 한다. 뇌졸중 출혈 병력을 가진 환자들에게는 특별히 주의하고 철저한 의료 감독 하에 이 약을 투여해야 한다.
- 3) 위장관계 위험: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 위 또는 장관의 출혈, 궤양 및 천공을 포함한 중대한 위장관계 이상반응의 위험을 증가시킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자는 중대한 위장관계 이상반응의 위험이 더 클 수 있다. 투여 기간이 길어질수록 중대한 위장관계 이상반응의 발생 가능성이 증가될 수 있으나 단기 투여 시 이러한 위험이 완전히 배제되는 것은 아니다. 이 약을 투여하는 동안 위장관계 궤양 또는 출혈의 증상 및 징후에 대하여 신중히 모니터링하여야 하며, 중증의 위장관계 이상반응이 의심되는 경우 즉시 추가적인 평가 및 치료를 실시하여야 한다. 비스테로이드성 소염진통제를 중증의 위장관계 이상반응이 완전히 배제될 때까지 투여 중단하는 것도 치료법이 될 수 있다. 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.

2. 다음 환자(경우)에는 투여하지 말 것

- 1) 활동성 소화성궤양/출혈 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 같은 계열의 일부 약물(디클로페낙)에 과민반응이 있는 환자
- 3) 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 억제제 포함)에 대하여 천식, 두드러기 또는 알레르기 반응 병력이 있는 환자(이러한 환자에서 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 치명적인 중증의 아나필락시소양 반응이 드물게 보고되었다.)
- 4) 아스피린 또는 다른 프로스타글린딘 합성효소 저해작용을 받는 약물에 의해 천식 위험의 증가, 두드러기 또는 구성비염을 일으킬 수 있는 천식환자
- 5) 관상동맥 우회술(CABG) 전후에 발생하는 통증의 치료
- 6) 중증 심부전 환자 및 울혈성 심부전 환자(NYHA II-IV), 허혈성 심장 질환, 말초동맥 질환 및/또는 뇌졸중 질환이 있는 환자
- 7) 중증 신장애 환자
- 8) 중증 간장애 환자
- 9) 과거 비스테로이드성 소염진통제 치료로 위장관출혈 또는 천공의 병력이 있는 환자
- 10) 임신 말기의 임부
- 11) 수유부
- 12) 크론병 또는 궤양성 대장염과 같은 염증성 장질환 환자
- 13) 출혈이 있거나 혈액응고장애가 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 신장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 체액저류 또는 심부전 환자
- 3) 니호제 또는 ACE억제제를 투여 중인 환자
- 4) 외과적 처치 후에 회복기에 있는 환자

- 5) 고령자
- 6) 기저치 천식 또는 그 병력이 있는 환자(비스테로이드성 소염진통제 투여로 기관지경련이 보고되었다.)
- 7) 포르피린 대사의 선천적 장애 환자
- 8) 고혈압 환자
- 9) 간장애 또는 그 병력이 있는 환자
- 10) 과거 비스테로이드성 소염진통제의 장기투여로 인한 소화관 궤양이 있는 환자로서, 이 약의 장기투여가 필요하여 미프로스름 등으로 소화성궤양 치료를 병행하고 있는 환자(미프로스름에 의한 치료에 저항성을 나타내는 소화성궤양도 있으므로 이 약을 투여하는 중 중반별 경과를 관찰한다.)
- 11) 임신 초기, 중기의 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 임신을 계획하는 여성
- 12) 항응고제를 투여받고 있는 환자

4. 이상반응

가장 흔하게 위장관계 이상반응, 어지러움, 간효소 수치 이상이 보고되었다. 드물게 가려움, 발진을 포함한 피부 이상반응

- 1) 혈색 및 림프계: 드물게 빈혈, 매우 드물게 백혈구 감소증, 혈소판감소증, 호중구감소증, 용혈성빈혈, 재생불량성빈혈, 무과립구증
- 2) 과민반응: 드물게 쇼크, 아나필락시반응
- 3) 대사: 매우 드물게 고칼슘혈증
- 4) 정신신경계: 자주 어지러움 매우 드물게 우울, 이상한 꿈, 불면
- 5) 감각계: 드물게 시각장애, 시신경염 매우 드물게 감각이상, 진전, 저음, 두통, 시각장애, 목경직, 발열 또는 병행감각장애, 착란, 환각, 어명, 권태
- 6) 순환기계: 매우 드물게 심계항진, 말초종창이 나타날 수 있다. 비스테로이드성 소염진통제와 관련하여 고혈압, 심부전 등이 보고되었다. 아세클로페낙은 디클로페낙과 구조적으로 유사하고, 디클로페낙으로 대체되기 때문에 많은 임상 및 약학 자료에서 동등 혈전 질환(심근경색증 또는 뇌졸중, 특히 고용량으로 정기간 치료시) 위험이 증가하는 것으로 나타났다. 또한 약학 자료에서는 아세클로페낙 투여와 관련하여 급성심낭염증후군 및 심근경색증의 위험이 증가하는 것으로 나타났다. 오히려 드물게 호흡관과 매우 드물게 기관지경련 협착을
- 7) 소화기계: 가장 흔한 위장관계 이상반응이 관찰된다. 소화성궤양, 천공 또는 위장출혈이 나타나며 때로는 심각한 경우도 있으며, 고령자에게 더 συχν하다. 자주 소화불량, 복통, 구취, 설사, 때때로 복부팽만감, 위염, 변비, 구토, 입냄새 드물게 흑색변, 매우 드물게 구내염, 토혈, 체중감, 대장염의 악화, 크론병
- 9) 간장애: 매우 드물게 간염, 황달, AST, ALT, ALP의 상승
- 10) 피부: 때때로 가려움, 발진, 피부염, 두드러기 드물게 알부민증 매우 드물게 자색반, 수포성피부염, 피부부적응증후군(스티븐스-존슨 증후군) 및 독성피부괴사(리얼증후군)을 포함하는 수포성 반응이 나타난다. 광민감반응, 모모
- 11) 신장: 심부전, 신장증후군
- 12) 국사반응: 부종, 피로, 다리경련
- 13) 기타: 자주 간효소상승, 때때로 혈중 요소 또는 크레아티닌 상승, 체중증가, 아노현상의 증가, 무균성관절염(전신무반응증후군) 및 혼혈결핵조직병(MCTD)과 같은 자가면역질환
- 14) 국내 부작용 보고자료의 분석 결과가 따라 다음 이상반응을 추가한다.
 - 피부: 혈관부종
 - 기타: 말초 부종, 눈 주위 부종

5. 일반적 주의

- 1) 이 약을 투여하기 전에 이 약 및 다른 대체 치료법의 잠재적인 위험성과 유익성을 고려해야 한다. 이 약은 각 환자의 치료 목적과 일치하도록 가능한 최단 기간동안 최소 유효용량으로 투여한다.
- 2) 위장관계 이상반응: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 권장량 질환 또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자에게 처방 시 극심한 경위를 기울여야 한다. 소화성 궤양 질환 및/또는 위장관 출혈의 병력이 있는 환자의 경우 이러한 위험인자가 없는 환자에 비해 비스테로이드성 소염진통제 투여시 위장관 출혈의 발생 위험이 10배 이상 증가하였다. 위장관계 출혈을 증가시키는 다른 위험인자로는 경구용 코르티코스테로이드 또는 항응고제 병용, 비스테로이드성 소염진통제의 장기 사용, 알코올 섭취, 고령, 허약한 건강상태 등이 있다. 치명적인 위장관계 이상반응에 대한 자발적 보고의 대부분은 고령자 및 허약자에 대한 것이므로, 이러한 환자에게 이 약을 투여시 특별히 주의하여야 한다. 고혈압: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압을 일으키거나, 기존의 고혈압을 악화시킬 수 있으며, 이로 인해 심혈관계 유해사례의 발생률이 증가될 수도 있다. 타이더드제 니호제 또는 푸루제 니호제를 복용중인 환자가 비스테로이드성 소염진통제 복용시 이들 요법에 대한 반응이 감소될 수 있다. 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제는 고혈압 환자에서 신중히 투여해야 한다. 이 약의 투여 초기와 투여기간 동안에 혈압을 면밀히 모니터링해야 한다. 울혈성심부전: 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제를 복용하는 일부 환자에서 체액 저류 및 부종이 관찰되었다. 이 약은 체액저류 또는 심부전에는 환자에게 신중히 투여해야 한다. 비스테로이드성 소염진통제를 장기간 복용시 신장유수과사나 기타 신장 손상이 일어날 수 있다. 또한, 신혈류를 유지하는데 프로스타글린딘의 역할이 중요하므로, 심부전 환자, 심부전 환자, 간부전 환자, 니호제나 ACE억제제를 투여 중인 환자, 고령자 등에서는 특별한 주의가 필요하다. 투약을 중단하면 대부분 치료 전 상태로 회복된다. 진행된 신질환: 진행된 신질환 환자에게 이 약 사용에 대한 투여된 임상 시험은 실시된 바 없다. 따라서, 진행된 신질환 환자에 대해서는 이 약의 투여가 권장되지 않는다. 이 약의 투여를 계속해야 한다면, 환자의 신장 기능에 대해서 면밀히 관찰해야 한다. 7) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제의 투여로 인한 수지의 상승이 나타날 수 있다. 이러한 비정상적인 검사수치는 치료에 지속됨에 따라 악화되거나 변화가 없거나 또는 일시적일 수 있다. 또한 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로 황달,

치명적 전적성 간염, 간괴사, 간부전(일부는 치명적임)을 포함한 중증의 간 관련 이상반응이 드물게 보고되었다. 간기능 이상을 일으키는 증상 및/또는 징후는 다음과 같은 간기능 실험 결과와 병행하여 나타나는 투여기간 동안 주된 증상은 간기능의 악화 여부를 관찰하고, 간질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후에: 호산구증가증, 발진이 발현되는 경우에는 이 약의 투여를 중단한다.

- 8) 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 투여로 빈혈이 나타날 수 있으므로 이 약의 정기 투여에 의해 빈혈의 증상은 징후가 나타나는 경우에는 헤모글로빈 또는 헤마토크리트 검사로 확인해야 한다. 비스테로이드성 소염진통제는 혈소판 기능을 억제하며, 일부 환자에서는 출혈 시간을 연장시키는 것이 확인되었다. 아스피린과 달리 이 약의 혈소판 기능에 대한 영향은 상대적으로 작고 지속기간이 짧으며 가역적이다. 응고 관련 질환이 있거나 항응고제를 투여하고 있는 경우와 같이 혈소판 기능 변경에 의해 부정적인 영향을 받을 수 있는 환자는 이 약을 투여하지 않는다.
- 9) 임상질문에 사용되는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - (1) 비스테로이드성 소염진통제를 장기 투여하는 환자는 정기적으로 전혈구 검사(CBC) 및 이화학적 검사를 실시해야 한다. 간질환 또는 신질환과 관련된 임상 증상이나 전신적인 징후(예: 호산구증가증, 발진)가 발현되거나 비정상적인 간기능 검사 또는 신기능 검사 결과가 지속되거나 악화되면, 이 약의 투여를 중단해야 한다.
 - (2) 약물요법 이외의 치료법도 고려한다.
 - (3) 임상질문에 사용되는 경우에는 다음 사항을 고려한다.
 - (1) 급성염증, 통증 및 발달의 정도를 고려하여 투여한다.
 - (2) 원칙적으로 동일한 약물의 정기투여는 피한다.
 - (3) 원인이 있으면 이것을 실시한다.
- 11) 아나필락시스요양 반응: 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 아나필락시스요양 반응은 약물에 노출된 경험이 없는 환자에서도 일어날 수 있다. 이러한 중증 증상은 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제 투여 후 비특이적으로 동반하거나 동반하지 않거나 또는 정맥적으로 치명적인 중증의 기저 경련을 동반하거나 나타내는 전신 환자에 전경적으로 발생한다. 이러한 아나필락시스요양 반응이 나타나는 경우 응급처치를 실시하여야 한다.
- 12) 피부반응: 이 약은 박탈피부염, 피부점막양중추근스티븐스-존슨 증후군 및 독성피로피사증(리델중추군) 같은 중대한 피부 이상반응을 일으킬 수 있으며, 이는 치명적일 수 있다. 이들 중대한 이상반응은 경도 증상 없이 발생할 수 있다. 대부분의 경우 이러한 이상반응은 투여 초기 1개월 이내에 발생한다. 환자는 중대한 피부 발진 증상 및 중추에 대해 알고 있어야 하며 피부 발진 또는 다른 과민반응의 최초 증상 및 징후가 나타날 때 약물 투여를 중단해야 한다.
- 13) 전신 환자 증 일부는 아스피린에 민감하게 반응할 수 있다. 아스피린 민감성 전신 환자에게 아스피린을 사용하는 경우 치명적일 수 있는 중증의 기관지경련과 관련될 수 있다. 이러한 아스피린 민감성 환자에서 아스피린과 다른 비스테로이드성 소염진통제 간의 기관지경련을 포함하는 교차반응이 보고되었다. 그러므로 이 약은 이러한 아스피린 민감성 환자에게는 투여하지 않도록 하며, 전신 환자에서는 주의 깊게 사용되어야 한다.
- 14) 이 약은 코르티코이드 대체를 대체하거나 코르티코이드 결핍증을 치료하기 위한 약물로 사용될 수 있다. 코르티코스테로이드의 갑작스러운 투여 중단은 코르티코스테로이드 반응성 질환의 악화를 초래할 수 있다. 장기인 코르티코스테로이드를 복용해 온 환자에게 이 약을 투여하고자 할 경우에는 서서히 용량을 감소시켜야 한다.
- 15) 이 약의 약리학적 특성상 염증의 다른 증상과 징후를 불현상화하여 통증성 및 비감염성 조건에서 감염성 합병증의 진단을 지연시킬 수 있다.
- 16) 어지러움 혹은 기타 중추신경계의 장애(졸음, 피로, 시각이상)를 느끼는 환자의 경우는 운전을 하거나 위험한 기계를 다루는 일을 해서는 안되며, 특별한 주의가 필요한 환경을 피한다.
- 17) 여성의 임신능력을 저하시킬 수 있으므로 임신을 계획중인 여성은 복용하지 않는 것이 좋다. 비스테로이드성 소염진통제를 장기 복용하는 여성에서 일시적인 불임이 보고되었다. 임신이 어렵거나 불임치료를 하고 있는 여성은 이 약의 투여를 중지하는 것이 바람직하다.
- 18) 소염진통제에 의한 치료는 원인이 아닌 대증요법에 유익한다.

6. 상호작용

- 1) 환자가 다른 약물 특히 디곡신, 항응고제, 경구용 당뇨병용제, 또는 이뇨제를 복용하고 있는 경우에는 의사와 상담하도록 한다.
- 2) ACE 억제제 또는 안지오텐신 II 수용체 길항제: 비스테로이드성 소염진통제에 의해 ACE 억제제 또는 안지오텐신 II 수용체 길항제의 혈고혈압효과가 감소될 수 있다는 보고가 있으므로 이 약과 ACE 억제제 또는 안지오텐신 II 수용체 길항제를 병용투여하는 경우 이러한 상호작용을 염두에 두어야 한다.
- 3) 아스피린: 아스피린과의 병용이 비스테로이드성 소염진통제의 사용과 관련된 중대한 심혈관계 혈전방해의 위험을 감소시킬 수 있다는 일관된 증거는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 이 약과 아스피린의 병용에 의해 중증의 위장관계 이상반응의 발생 위험이 증가될 수 있으므로 두 약물의 병용은 일반적으로 권장되지 않는다.
- 4) 이뇨제
 - (1) 임상시험 및 시판후 조사 결과 이 약의 신장에서의 프스타딘관련 할할 억제에 의해 일부 환자에서 루로세미드 및 티아지드계 이뇨제의 나트륨노배설 효과가 감소될 수 있음이 확인되었다. 이들 약물과 비스테로이드성 소염진통제를 병용투여하는 동안 신부전 징후를 면밀히 관찰해야 한다.
 - (2) 칼륨보존이뇨제와 병용시 혈장중 칼륨농도가 증가할 수 있으므로 혈중 칼륨농도를 관찰해야 한다. 벤드로플루자이드와 병용시 혈압조절에 영향을 미치지 않는 알려진 바 없음, 다른 이뇨제와의 상호작용은 배제될 수 없다.
- 5) 리튬: 비스테로이드성 소염진통제는 신장에서의 프스타딘관련 할할 억제에 의해 혈장 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신정소율을 감소시킬 수 있다. 따라서 비스테로이드성 소염진통제와 리튬의 병용 투여 시 리튬의 독성 징후를 주의깊게 관찰해야 한다.
- 6) 메토크레티드: 비스테로이드성 소염진통제와의 병용투여로 신쇄노관에서 메토크레티드의 배설이 지연되어 치명적인 메토크레티드의 혈액학적 독성이 증가될 수 있으므로 항암요법에 사용되는 고용량(15mg) 이상의 메토크레티드와는 병용투여하지 않으며, 저용량의 메토크레티드와 병용투여 시 신중히 투여되어야 한다.
- 7) 쿠마린계 항응고제(와파린 등): 위장관계 출혈에 대하여 와파린과 비스테로이드성 소염진통제는 상승작용을 나타낼 수 있으므로 두 약물을 함께 사용하는 환자는 단독으로 투여하는 경우에 비해 중증의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다.

- 8) 다른 비스테로이드성 소염진통제(선택적 COX-2 억제제 포함)와 병용할 경우 이상반응의 위험이 증가될 수 있으므로 병용하지 않는다.
- 9) 이 약은 CYP2C9와 CYP2C19에 의해 대사되며, 시메티딘, 미코나졸, 셀레파나졸, 아미모데온, 톨부타미드, 페닐부타돈과 약동학적 상호작용 가능성이 있다.
- 10) 간질환: 비스테로이드성 소염진통제는 시구체 여과율을 감소시키고 배설체의 혈중 농도를 증가시켜서 심부전을 악화시킬 수 있다.
- 11) 미페프리스론: 비스테로이드성 소염진통제는 미페프리스론의 효력을 감소시키기 때문에 미페프리스론 투여 후 8 ~ 17일 동안 투여해서는 안된다.
- 12) 쿠를론계 항생제: 비스테로이드성 소염진통제와 병용 투여 시 경련이 발생할 위험이 증가될 수 있는 동물실험 데이터가 있으므로 주의한다.
- 13) 항응고제: 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI): 이 약과 병용 시 위장관 출혈의 위험이 증가될 수 있다.
- 14) 시클로스포린 및 타크로리무스: 비스테로이드성 소염진통제와 병용투여로 신독성의 위험이 증가할 수 있다.
- 15) 지드부단: 비스테로이드성 소염진통제와 병용 투여 시 혈액학적 독성이 증가될 수 있다. HIV+ 혈염병 환자에서 지드부단 및 이부프로펜을 병용투여 했을 경우 혈관염증과 혈종의 발생 위험이 증가했다는 증거가 있다.
- 16) 당뇨병용제: 디글로페논은 경구 혈당강하제와 병용시 경구 혈당강하제의 임상적 효과에 영향을 주지 않는다는 임상결과가 있었으나, 이 약의 지드부단에 저혈당과 고혈당 효과가 드물게 보고되었으므로, 저혈당약의 용량을 조절해야 한다.
- 17) 코르티코스테로이드: 이 약과 병용 시 위장관 괴양 또는 출혈의 위험이 증가될 수 있다.

7. 일부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 이 약을 임부에게 투여한 임상자료는 없다. 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 임신 말기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관용 조가 폐쇄시킬 수 있으므로 임신을 계획하는 여성이나 임신 초기 및 중기의 임부에게 용량 및 사용기간을 최소한으로 신중히 투여하고, 임신말기(최저마 3분기)의 임부에게는 투여하지 않는다.
- 2) 현재까지 알려진 자료로는 임부에 대한 안전성은 충분히 확립되어 있지 않으며, 컷에 대한 실험에서 비스테로이드성 소염진통제는 프스타딘관련 합병증을 저해하는 다른 약물과 마찬가지로 난산의 발생 빈도를 증가시키고, 분만을 지연시키며 태아의 생존율을 감소시켰다.
- 3) 현재까지 알려진 자료로는 수유부에 대한 안전성은 충분히 확립되어 있지 않으며, 이 약이 사람의 모유로 분비되는지는 알려져 있지 않다. 그러나 많은 약물들이 모유 중으로 이행될 뿐만 아니라, 이행될 경우 영아에게 심각한 이상반응의 발생이 우려되므로, 수유부에 대한 약을 투여의 중요성을 고려하여 수유를 중단하거나 약물 투여를 중단해야 한다.

8. 소아에 대한 투여

소아에 대해서는 정해진 용량범위가 적용되지 않거나 설정되어 있지 않으나 및 청소년에서 이 약의 안전성과 유효성은 확립되지 않았다.

9. 고령자에 대한 투여

고령자에게 비스테로이드성 소염진통제에 대한 이상반응 특히, 위장관 출혈과 천공 발생 빈도가 증가한다. 그러므로, 다른 비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 고령자에게 이 약을 투여 시 주의한다.

10. 과량투여시의 처치

과량투여로 인한 전혈액의 중상은 알려져 있지 않으나, 실제로 과량 복용 시에는 관찰되는 증상에 따라 처치하도록 하며, 위장관 자극, 저혈압, 호흡저하, 경련 등에 대비하도록 한다.

11. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지 면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것.

[포장단위] 30정, 300정

[저장방법 및 사용기간]

- 기밀용기, 실온(1 ~ 30 °C) 보관 • 제조일로부터 36개월

*주의

1. 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용하십시오.
3. 의약품을 사용하기 전에 사용자에게는 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 의약품과 함께 보관하십시오.
4. 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 보관하십시오.
5. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

[취급상의 주의사항]

1. 본 의약품은 엄격한 품질관리를 받은 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변색 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
2. 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

알보플로리다주식회사 경기도 화성시 향남읍 계약로2길 36
소비자 상담전화 02-2047-7700

작성년월일: 2017년 06월 29일

이 첨부문서는 작성일(2017년 06월 29일) 이후 변경된 내용은 이지드(<http://ezdrug.mfds.go.kr>) - [정보마당]-[의약품정보]란에서 확인하실 수 있습니다.