

# 아테로이드® 연질캡슐

(설포뮤코폴리사카라이드)

## ATEROID®

전문의약품	
분류번호	219



### [원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

- 유효성분: 설포뮤코폴리사카라이드(별규) …… 200 L.R.U(Lipoprotein lipase Releasing Unit)
- 동물유래성분: 설포뮤코폴리사카라이드(돼지, 소장 점막)
- 첨가제(타르색소): 알루미늄레이크 청색 1호, 알루미늄레이크 황색 5호
- 첨가제: 글리세린, 라우릴황산나트륨, 옥수수기름, 적색산화제이철, 젤라틴, 콜로이드성이산화규소, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히프로멜로오스 2910, 히프로멜로오스프탈레이트 200731

### [성상]

미색의 유상물질이 든 암적색의 타원형 연질캡슐

### [효능·효과]

혈전 위험성이 있는 혈관질환의 증상개선(만성 노인성 뇌혈관 질환, 뇌동맥경화로 인한 뇌기능 부전)

### [용법·용량]

성인: 설포뮤코폴리사카라이드로서 1회 24mg를 1일 1~3회 식간에 경구투여하며 증상에 따라 1일 96~144mg까지 증량할 수 있다.

### [사용상의 주의사항]

#### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약, 이 약의 구성성분, 헤파린 또는 헤파인 유사약물에 과민반응 환자
- 2) 신경과민 환자
- 3) 출혈체질 및 출혈질환이 있는 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부

#### 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 혈액응고저지제를 투여받은 환자
- 2) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

#### 3. 상호작용

항응고효과를 증가시킬 수 있으므로 혈액응고저지제와 병용투여하는 경우에는 정기적인 혈액응고지표검사를 실시한다.

#### 4. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의한다.

### [포장단위]

90캡슐, 180캡슐

### [저장방법 및 사용기간]

밀폐용기, 실온 (1~30°C)보관 · 사용기간: 제조일로부터 36개월(3년)

### ※ 주의

1. 의약품을 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용하십시오.
3. 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.
4. 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 보관하십시오.
5. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

### [취급상의 주의사항]

1. 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
2. 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

### 제조사

알보젠코리아주식회사, 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 55-8  
소비자상담전화: 02-2047-7700

작성년월일: 2017년 07월 14일

이 첨부문서 작성일(2017년 07월 14일)이후 변경된 내용은 이지드럭 (<http://ezdrug.mfds.go.kr>) → [정보마당] - [의약품 정보란] 에서 확인할 수 있습니다.