

엘카리나 정 330 mg

(엘카르니틴)

L-CARINA

조제용	
일반의약품	
분류번호	219



본 제품은 인습성이 강하므로 PTP상태로 조제, 보관하여 주시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

- 유효성분: 엘카르니틴(USP) 330mg
- 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 아크릴리즈 MP화이트, 오파드라이AMB화이트, 오파드라이화이트, 카르복시메틸셀룰로오스칼슘, 포비돈

[성상]

흰색의 원형필름코팅정

[효능·효과]

1. 1차성, 2차성 카르니틴결핍증
2. 허혈성심질환에 의한 심근대사장애: 협심증, 급성심근경색

[용법·용량]

성인: 엘-카르니틴으로서 1일 2 ~ 3g을 2 ~ 3회 분할 경구투여한다.
(복용한다.) 연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

[사용상의 주의사항]

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약에 과민증 환자

2. 이상반응

일시적인 구역·구토, 복통(배아픔), 설사, 체취가 나타날 수 있다.

3. 임부 및 수유부에 대한 투여

- 1) 임신 중의 투여에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
- 2) 모유의 이행은 알려진 바 없으나 많은 약들이 모유로 이행되므로 수유 중에는 신중히 투여한다.

[포장단위]

90정

[저장방법 및 사용기간]

- 기밀용기, 실온(1~30°C)보관
- 제조일로부터 36개월

* 주의

1. 의약품은 어린이 손에 닿지 않게 보관하십시오.
2. 정해진 용법·용량을 준수하여 사용하십시오.
3. 의약품 사용하기 전에 사용자께서는 첨부문서를 주의 깊게 읽으시고, 의약품과 함께 보관하십시오.
4. 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 보관하십시오.
5. 사용기한이 지난 의약품은 사용하지 마십시오.

[취급상의 주의사항]

1. 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
2. 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.

제조의뢰자

알보젠코리아주식회사

경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 36

소비자상담번호: 02-2047-7700

* 부작용 피해구제 신청: 한국의약품안전관리원(1644-6223)

제조사

(주)씨트리

경기도 남양주시 경강로 27

작성년월일: 2017년 11월 16일

이 첨부문서는 작성일(2017년 11월 16일)

이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.mfds.go.kr>)→[정보마당]-[의약품 정보] 란에서 확인할 수 있습니다.